

果樹3. みかん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ミカンナガタマムシ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	-----------	-------	----

殺虫剤

	1A	NAC	マイクロデナポン水和剤85(劇)					○			○											○	ハマキムシ類に適用あり ミツバチに対して影響あり。	
	1B	MEP	スミチオン乳剤					○			○	○	○	○	※								○	※ナシマルカイガラムシ(サンホーゼカイガラムシ)で適用 カネタタキ、ハマキムシ類、ミカンツボミタマバエに適用あり ミツバチに対して影響あり。
		イソキサチオン	カルホス乳剤(劇)			○			○		○										※		○	※成虫で適用 カネタタキ、ミノガ類、コカクモンハマキ、クワゴマダラヒトリ若齢幼虫に適用あり ミツバチに対して影響あり。
		MEP	ガットサイドS																			※	○	葉にかかると葉害の恐れがあるので樹幹部のみに散布する。 ※カミキリムシ類で適用
		DMP	スプラサイド乳剤40(劇)						※1						※2	※3	※4	※5			○	※6	※7	○
	3A	フルバリネート	マブリック水和剤20(劇)					○	○		○	○	※	○										※チャノキイロアザミウマで適用 ケムシ類に適用あり
		クロルピリホス	ダズバンDF(劇)										※		○									みかん(露地栽培)で適用 ※ミカンキイロアザミウマで適用 クワゴマダラヒトリでも適用あり ミツバチに対して影響あり。
	6	レピメクチン	アニキ乳剤			○	○	○	○				※											※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
		エマメクチン安息香酸塩	アフーム乳剤					○					○											ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり。
	10B	エトキサゾール	パロックフロアブル		○	○																		
	12C	BPPS	オマイト水和剤	○	○																			幼木では新芽の生育期間、成木では春芽が硬化するまでの期間は使用を避ける。また、果実の肥大期~着色初期の散布は着色むらを生じることがあるので使用を避ける。
	15	ルフェヌロン	マツチ乳剤			○		○	○				※											※チャノキイロアザミウマで適用 ヨモギエダシヤクに適用あり
	16	ブプロフェジン	アブロード水和剤												※1								※2	※1幼虫で適用 ※2若齢幼虫で適用
		ブプロフェジン	アブロードフロアブル												※1									※2
	19	アミトラズ	ダニカット乳剤20		○	○																	※	※幼虫で適用 ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララ50DF					○					○											
	6 10B	アバメクチン・エトキサゾール	メビウスフロアブル(劇)		○	○	○	○					○											ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。