

果樹5. なし

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ニセナシサビダニ	アブラムシ類	カイガラムシ類	コナカイガラムシ類	クワコナカイガラムシ	カメムシ類	ハマキムシ類	ナシヒメシシクイ	ナシクイムシ類	ナシホソガ	ナシチビガ	ケムシ類	ナシガンバイ	チュウゴクナシキジラミ	アザミウマ類	カミキリムシ類	ナシミハバチ	備考

殺虫剤2(その他)

1A	NAC	マイクロデナボン水和剤85(劇)																					日本なしで適用 ミツバチに対して影響あり。
	アラニカルブ	オリオン水和剤40(劇)																					ミツバチに対して影響あり。
1B	クロルピリホス	ダーズバンDF(劇)																					ミツバチに対して影響あり。
	CYAP	サイアノックス水和剤																					ミツバチに対して影響あり。
	DMTP	スブラサイド水和剤(劇)																					新水、幸水、豊水は5~6月上旬の新葉展開時では葉害を生じやすいのでその期間は使用しない。ミツバチに対して影響あり。
	MEP	スミチオン水和剤40																					早生赤種には葉害を生ずるので使用をさける。ミツバチに対して影響あり。
3A	シベルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)																					ミツバチに対して影響あり。
	アクリナトリン	アーデント水和剤																					ミツバチに対して影響あり。
	アクリナトリン	アーデントフロアブル																					ミツバチに対して影響あり。
	トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)																					ミツバチに対して影響あり。
	ピフェントリン	テルスター水和剤																					ミツバチに対して影響あり。
	フルバリネート	マブリック水和剤20(劇)																					
	フェンプロバトリン	ロビンフッド																					ヒメボクトウにも適用 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射
4A	チアメキサム	アクタラ顆粒水溶剤																					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)																					ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)																					
	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤																					ミツバチに対して影響あり
	クロチアニジン	ダントツ水溶剤																					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	ニテンピラム	ベストガード水溶剤																					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)																					長十郎、新高、八雲、愛甘水に対しては葉に黒変の葉害を生じることがあるので使用しない。
4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル																				ミツバチに対して影響あり。	
5	スピネトラム	ディアナWDG																				ミツバチに対して影響あり。	
9C	フロニカミド	ウララDF																					
9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤																				ミツバチに対して影響あり。	
15	テフルベンズロン	ノーモルト乳剤																					
16	ブプロフェジン	アブロード水和剤																					カイガラムシ類は幼虫で適用
	ブプロフェジン	アブロードフロアブル																					
18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル																					
21A	トルフェンピラド	ハチハチフロアブル(劇)																					ミツバチに対して影響あり。
28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤																					
	フルベンジアミド	フェニックスフロアブル																					フタモンマダラメイガ、ヒメボクトウにも適用
	クロラントラニプロール	サムコルフロアブル10																					ヒメボクトウにも適用。
	シアントラニプロール	エクシレルSE																					ヒメボクトウにも適用。マメコバチに対して影響あり。
	テトラニプロール	ヨーパルフロアブル																					ヒメボクトウにも適用。ミツバチに対して影響あり。