

作物1-9. 稲・生育期本田処理剤(殺虫剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	イネミズゾウムシ	イネゾウムシ	ウンカ類	ツマグロヨコバイ	コブメイガ	イネツトムシ	フタオビコヤガ	ニカメイチュウ	アヲヨトウ	イネヒメハモグリバエ	イネカラバエ	イネドロオウムシ	カメムシ類	イナゴ類	イネアザミウマ	アザミウマ類	スクミリンゴガイ	スクミリンゴガイ	食害防止コカイ	WCS用稲に使用可	飼料用米(籾)に出	備考
--------	--------	-----	-----	----------	--------	------	----------	-------	--------	---------	---------	-------	------------	--------	----------	-------	------	---------	--------	----------	----------	---------	-----------	-----------	----

1. 粉剤

	3A	エトフェンブロックス	トレボン粉剤DL	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※イネミズゾウムシはイネミズゾウムシ成虫で適用。 速効性だが、浸透移行性はなく、薬剤が虫体にかからないと効果が劣る。ミツバチに対して影響あり。			
	4A	ジノテフラン	スタークル粉剤DL アルバリン粉剤DL		○	○			○	○					○	○	○							○	○	ミツバチに対して影響あり。		
		クロチアニジン	ダントツ粉剤DL		○	○			○						○	○	○								○	○	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり。	
	3A 4A	エトフェンブロックス・ジノテフラン	トレボンスター粉剤DL		○	○	○		○	○					○										○	○	ミツバチに対して影響あり。	
	4C	スルホキサフロ	エクシード粉剤DL		○	○									○											○	○	ミツバチに対して影響あり。

2. 粒剤

6		イソプロチオラン	フジワン粒剤		※																					○	○	※ウンカ類はトビウロンカで適用。			
	2B	エチプロール	キラップ粒剤		○										○												○	○	大型種カメムシ類には効果が劣る。ミツバチに対して影響あり。		
	3A	エトフェンブロックス	トレボン粒剤	○	○	○			※	○					○												○	○	※ニカメイチュウ第1世代で適用。ミツバチに対して影響あり。		
	4A	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤	○	○	○			○						○	○											○	○	ミツバチに対して影響あり。		
			スタークル豆つぶ		○	○										○												○	○	湛水状態(3~5cm程度)で田面に均一に散布する。 ほ場の状況や処理条件によっては、大型種カメムシ類に効果が劣る場合がある。 ミツバチに対して影響あり。	
		クロチアニジン	ダントツ粒剤		○	○			○						○												○	○	ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。		
	その他	石灰窒素	石灰窒素50 石灰窒素55																	○									○	○	定植前および収穫後に使用する。ザリガニ、ユリミズ、水田一年生雑草にも適用がある(但し、使用量、使用時期、使用方法が異なる)。詳細は農薬ラベルで確認する。
	不明	メタルデヒド	スクミノン ジャンボたにしくん																	○								○	○	-	
	不明	磷酸第二鉄	スクミンベイト3																	○								○	○	-	

3. 液剤

	1B	MEP	スミチオン乳剤						○	○	○	○	○	○	○												○	○	ニカメイチュウ第1世代・第2世代で適用。ヒトビウカ、アブラムシ類、イネシシガレセンチュウ、イネハモグリバエ、サンカメイチュウ第3世代にも適用あり。ミツバチに対して影響あり。	
	2B	エチプロール	キラップフロアブル		○										○	○	○											○	○	ミツバチに対して影響あり。
	3A	エトフェンブロックス	トレボン乳剤	○	○	○									○	○	○											○	○	ミツバチに対して影響あり。
			なげこみトレボン	○	○	○			○							○	○	○											○	○
	4A	ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤		○	○									○													○	○	ミツバチに対して影響あり。
			スタークル液剤10 スタークルメイト液剤10		○	○										○													○	○
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤		○	○									○	○	○											○	○	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり。
	4C	スルホキサフロ	エクシードフロアブル		○	○									○	○												○	○	ミツバチに対して影響あり。
	5	スピネトラム	ディアナSC				○	○	○																			○	○	ミツバチに対して影響あり。
	11A	BT	チューンアップ顆粒水和剤				○	○																						-
	4F	フルピリミン	エミリアフロアブル		○	○									○	○												○	○	

作物1-9. 稲・生育期本田処理剤(殺虫剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	イネミズゾウムシ	イネソウムシ	ウンカ類	ツマグロヨコバイ	コブノメイガ	イネノツトムシ	フタオビコヤガ	ニカメイチュウ	アワヨトウ	イネヒメハマグリバエ	イネカハラバエ	イネドロオイムシ	カメムシ類	イナゴ類	イネアザミウマ	アザミウマ類	スクミリンゴガイ	スグミリンゴガイ	食害防止剤	WCS用稲に使用可	飼料用米(粍)に出 種以降も使用可	備考
--------	--------	-----	-----	----------	--------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------	------------	---------	----------	-------	------	---------	--------	----------	----------	-------	-----------	----------------------	----

3. 液剤

	16	プロフェジン	アブロードフロアブル			○	○																	○	○	ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫で適用。遅効的だが、残効性に優れる。成虫に直接効果は無いが、卵をふ化させない作用がある。	
			アブロード水和剤			○	○																			○	○
	18	テプフェジド	ロムダンゾル				○	○		○															○	-	
	UN	ベンズピリモキサン	オーケストラフロアブル			○	○																		○		ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫で適用。
	4A UN	ジノテフラン・ベンズピリモキサン	オーケストラスタークルエア			○									○												ミツバチに対して影響あり。
	3A 4A	エトフェンブロックス・ジノテフラン	トレボンスターフロアブル			○	○	○		○					○										○	○	ミツバチに対して影響あり。
	4A 16	ジノテフラン・プロフェジン	アブロードスタークルゾル			○	○								○										○	○	ミツバチに対して影響あり。

作物1-10. 稲・生育期本田処理剤(殺虫殺菌剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病	紋枯病	こま葉枯病	もみ枯病	内臓細菌病	葉枯病	葉白化病	葉焼け病	葉黄化病	葉黒化病	葉萎縮病	葉腐敗病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	葉欠損病	WCS用稲に使用可	飼料用米(粍)に出 種以降も使用可	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-------	------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------------------	----

1. 粉剤

U16 (不明)	2B	エチプロール・テブフロキン	トライK粉剤DL	○																						○		ミツバチに対して影響あり。
U14 16.1	3A	エトフェンブロックス・フェリムゾン・フサライド	ブラシントレボン粉剤DL	○	○	○																				○		ミツバチに対して影響あり。
U16 不明	3A	エトフェンブロックス・テブフロキン	トライトレボン粉剤DL	○																						○		ミツバチに対して影響あり。
16.1	4A	ジノテフラン・トリシクラゾール	ビームスタークル粉剤5DL	○		○																						ミツバチに対して影響あり。
U16 不明	4A	ジノテフラン・テブフロキン	トライスタークル粉剤DL	○																						○		ミツバチに対して影響あり。
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークル粉剤DL	○																						○		ミツバチに対して影響あり。
24 16.1 U18	3A	エトフェンブロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール・バリダマイシン	ダブルカットバリダトレボン粉剤3DL	○	○		○	○																				ミツバチに対して影響あり。
U18 U14 16.1	14 4A	カルタップ・クロチアニジン・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド	ハスラー粉剤DL	○	○	○		○	○																			ミツバチに対して影響あり。
16.1 U18 U14	3A	エトフェンブロックス・トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン	ノンプラストレバリダ粉剤DL	○	○	○																						ミツバチに対して影響あり。
16.1 7	4A 18 16	ジノテフラン・テプフェジド・プロフェジン・フサライド・フルトラニル	ワイドナーエース粉剤DL	○	○																					○		ミツバチに対して影響あり。
7	18 UN	テプフェジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル	オーケストラロムダンモンカット粉剤DL			○																				○		ウンカ類幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫で適用あり。

作物1-10. 稲・生育期本田処理剤(殺虫殺菌剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病	紋枯病	こま葉枯病	葉枯病(葉枯病)	もみ枯細菌病	内類褐変病	葉色病(カリーラリア菌)	葉色病(アルタナリア菌)	葉色病(アムニダナリア菌)	稲こうじ病	墨黒穂病	ウンカ類	ツマグラヨコバイ	イネツトムシ	コブノメイガ	フタオビコヤガ	ニカメイチュウ	イネドロオウムシ	カメムシ類	イナゴ類	アザミウマ類					WCS用稲に使用可	飼料用米(穀)に出	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-------	----------	--------	-------	--------------	--------------	---------------	-------	------	------	----------	--------	--------	---------	---------	----------	-------	------	--------	--	--	--	--	-----------	-----------	----

2. 粒剤

16.1	4A	ジノテフラン・ピロキロン	コラトップスタークル1キロ粒剤	○											○	○													○	カメムシ類の適用については、大型種カメムシ類では効果が劣る。
6	2B	エチプロール・イプロチオラン	フジワンラップ粒剤	○										○	○					○	○								○	カメムシ類の適用については、大型種カメムシ類では効果が劣る。
P02	14 1A	カルタップ・BPM C・プロベナゾール	バダンバッサオリゼメート粒剤(劇)	○			○								○	○	○			○	○									白葉枯病にも適用があり、イネミスゾウムシにも適用がある。
3 16.3	4A	ジノテフラン・シメコナゾール・トルプロカルブ	ゴウケツモンスター粒剤 ガッツスター粒剤	○	○	○	○						○	○	○	○			○		○									

3. 液剤

16.1	4A	ジノテフラン・フサライド	ラブサイドスタークルフロアブル	○											○	○													○	ミツバチに対して影響あり。		
U16	2B	エチプロール・テブフロキン	トライクフロアブル トライラムフロアブル	○									○	○															○	ミツバチに対して影響あり。		
1	4A	ジノテフラン・チオファネートメチル	トップジンスタークルフロアブル	○	○								○	○	○														○	ミツバチに対して影響あり。		
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークルゾル	○			○	○	○	○	○				○	○													○	ミツバチに対して影響あり。		
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークルRゾル	○											○														○	ミツバチに対して影響あり。		
16.1	4C	スルホキサフロル、トリシクラゾール	ビームエイトエクシードゾル ビームエイトEXゾル	○											○	○														○	ミツバチに対して影響あり。	
16.1	4A	ジノテフラン・トリシクラゾール	ビームエイトスタークルゾル	○											○	○														○	ミツバチに対して影響あり。	
7	16	ブプロフェジン・フルトラニル	アブロードモンカットエア		○										○	○													○	○	ウンカ類幼虫、ツマグラヨコバイ幼虫で適用あり。	
7	18 16	テブフェジド・ブプロフェジン・フルトラニル	アブロードロムダンモンカットエア		○										○	○	○												○			
7	18 UN	テブフェジド・ベンズピリモキサ・フルトラニル	オーケストラロムダンモンカットエア		○										○	○	○												○		○	ウンカ類幼虫、ツマグラヨコバイ幼虫で適用あり。