

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										藻類・表層剥離	使用時期	WCS 用イネに 使用可	備考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ				

は種前施用

9	グリホサートカリウム塩	ラウンドアップマックスロード	一年生雑草及び多年生広葉雑草													○	①耕起前(雑草生育期) ②は種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培) ③耕起直後～出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培)	○	
9	グリホサートイソプロピルアミン塩	草枯らし	一年生雑草	多年生雑草											①耕起20～10日前(雑草生育期)1年生雑草のみ ②耕起直後～出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培) ③は種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)	○	・雑草茎葉散布 ・汎用除草剤の項参照		
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ	一年生雑草														①耕起前(雑草生育期) ②播種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)	○	
9・14	グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル	サンダーボルト007	一年生雑草														耕起20～10日前(雑草生育期)		
22・22	ジクワット・パラコート	ブリグロックスL(毒)	一年生雑草														秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、播種前14日～播種後7日(稲出芽前)	○	

は種時施用(は種同時散布機で施用)

2	ピリミノバクメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○														は種時	○	・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。
2・27	ピリミノバクメチル・フェンキトリアン	ベルーガ1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○					○	○				は種時	○	
2・2・27	イマズスルフロン・ピリミノバクメチル・フェンキトリアン	マスラオ1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○					○	○				は種時	○	
2・27	トリアファモン・フェンキトリアン	ブライオリティ1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○					○	○				は種時	○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	テフリルトリアン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤	水田一年生雑草	○	○	○	○					○	○				は種時	○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物となす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しない。
33・2・27	シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタ1キロ粒剤 クサエボン1キロ粒剤	一年生雑草	○	○	○	○					○					は種時		・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。