除草1-2.直播水稲除草剤

播種後施用

HRACコード	成分名	商品名	一年生 ノビエ	一年生 一年生イネ科雑草	一年生 一年生広葉雑草	多年生 マツバイ	多年生 ホタルイ	多年生 ウリカワ	多年生 ミズガヤツリ	多年生 クログワイ	多年生 オモダカ	多年生 セリ	多年生 ヒルムシロ	多年生 コウキヤガラ	多年生 多年生イネ科雑草	多年生 キシュウスズメノヒエ	藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法 無人航空機	他の使用方法 水口施用	他の使用方法 湛水周縁散布	WCS用イネに使用可	備　考
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○															①は種後10日～ノビエ3葉期(但し、収穫30日前まで) ②は種後25日～ノビエ4葉期まで(但し、収穫30日前まで)	○			○	・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		クリンチャージャンボ	○															は種後10日～ノビエ3葉期(但し、収穫30日前まで)				○	
		クリンチャーEW		○														は種後10日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)	○			○	・落水状態で散布する。 ・広葉雑草が多い場合には、有効な剤と組み合わせて使用する。
1	メタミホップ	トドメMF1キロ粒剤	○															イネ3.5葉期～ノビエ4葉期まで(但し、収穫50日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		トドメMF乳剤	○															は種後10日～ノビエ6葉期まで(但し、収穫50日前まで)				○	
2	プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩	フルスコアZ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ2葉期～ノビエ3.5葉期まで(但し、収穫60日前まで)	○				・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		フルスコアZジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ2葉期～ノビエ3.5葉期まで(但し、収穫60日前まで)					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2	ペノキススラム	ワイドアタックSC	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)				○	・前処理剤との体系で使用する。 ・展着剤は加用しない。 ・散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ・ｲﾎﾞｸｻ、ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ、ｱｾﾞｶﾞﾔ、ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ等には効果が低い。
2	ピリミスルファン	アトトリ1キロ粒剤								○	○							イネ5葉期～収穫45日前まで	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		アトトリ豆つぶ250								○	○							イネ5葉期～収穫45日前まで	○			○	
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○															は種直後～稲出芽前				○	・ノビエの発生前～4葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。 ・落水後、土壌が落ち着いたら散布する。
			○															イネ3葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	・ノビエの発生前～5葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。
		ヒエクリーン豆つぶ250	○															イネ3葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	・稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○			○	○			○						イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
15	ベンチオカーブ	サターン乳剤	○	○	○	○												①は種直後～稲出芽前(入水15日前まで) ②稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)(入水15日前まで)					
27・27・2	ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	ジカマック500グラム粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ1.5葉期まで(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・14・0	イマゾスルフロン・ピラクロニル・プロモブチド	バッチリ1キロ粒剤	水田一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ出芽始期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・出芽揃以降の使用を推奨する。
2・2・27	イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	マスラオ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期までの使用を推奨する。
		ベルーガ1キロ粒剤	水田一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	
		ベルーガジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	
		ベルーガ豆つぶ250	一年生雑草			○	○	○	○			○	○						○			○	

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期（但し、収穫60日前まで）				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる可能性があるため、稲1葉期～ノビエ3葉期までの使用を推奨する。
		エンペラー豆つぶ250	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○		○			○	
		エンペラージャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○	イネ出芽揃期～ノビエ3葉期（但し、収穫75日前まで）				○	
		エンペラーフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）				○	
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		プライオリティジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○									○	
		プライオリティ豆つぶ250	一年生雑草			○	○	○	○			○	○						○			○	
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤	水田一年生雑草			○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
		カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードプロフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○				○						○	○		○	
		カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）				○	
27・2	テフリルトリオン・プロピリスルフロン	ガツントZ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		ガツントZフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○		○	○		○	
		ガツントZジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○					○	
		ガツントZ200FG	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○		○		○	○	
14・0・2・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ブロモブチド・ピラクロニル	サラブレッドGO1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○				・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		サラブレッドGOフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○		○	○			
		サラブレッドGOジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○						
		サラブレッドGO400FG	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○		○		○		
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	
		バッチリLXフロアブル	水田一年生雑草			○	○	○	○			○	○						○			○	
		バッチリLX400FG	一年生雑草			○	○	○	○			○							○		○	○	
15・2・27	イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン	ツルギジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期（但し、収穫90日まで）				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		ツルギ250粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○						○		○	○	
		ツルギフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○										○			○	
4・27・15	クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド	イネリーグ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		イネリーグフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	
0・15・27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル	ラオウ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		ラオウジャンボ	一年生雑草				○	○	○			○	○									○	
		ラオウフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○									○	
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○				○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
27･14･2	テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン	アットウZ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15･27･2	フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン	アカツキ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫60日前まで）					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		アカツキジャンボ	一年生雑草				○	○	○			○	○										
		アカツキ豆つぶ250	一年生雑草				○	○	○			○	○						○				
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫75日前まで）				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		ベッカクジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○									○	
		ベッカク豆つぶ250	一年生雑草			○	○	○	○			○	○						○			○	
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○									○	
		カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○						○			○	
2･2･15･27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		アピログロウMXジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○									○	
15･27･2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空エアー粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0･27･2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		ディオーレフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）				○	
		ディオーレジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）				○	
14･2･0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・プロモブチド	アッパレZ400FG	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27･14･2	フェンキノトリオン・ベントキサゾン・メタゾスルフロン	流星1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
		流星フロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	○			○	
		流星ジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）				○	
4･27･15	クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド	イネリーグジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･2･27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMXジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）				○	
		ジャンダルムMX豆つぶ250	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）	○		○	○	
0･27･2･0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・プロモブチド	シンズイZ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期（但し、収穫90日前まで）				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
		シンズイZフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○			○	○									○	
		シンズイZジャンボ	一年生雑草				○	○	○			○	○									○	
		シンズイZ豆つぶ250	一年生雑草				○	○	○			○	○						○			○	
33･2･27	シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタ1キロ粒剤 クサウェポン1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○				○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
		ジャスタジャンボ クサウェポンジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	
		ジャスタフロアブル クサウェポンフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○				○				○		○	○		○	

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○				○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土ではイネ2葉期以降の使用を推奨する。
		ウルティモZフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○				○						○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土ではイネ3葉期以降の使用を推奨する。
2・27・2	ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン	アクシズMX1キロ粒剤	水田一年生雑草			○	○		○			○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラフロアブル	一年生雑草			○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)	○	○			・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・イネ1葉期～ノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
		アシュラ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)	○				
		アシュラジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)					
		アシュラ400FG	一年生雑草			○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)					
27・2・4	テフリルトリオン・トリアファモン・フロルピラウキシフェンベンジル	ストレングス1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
1・5・2・27	シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	ハイカット1キロ粒剤 サンパンチ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○				○					イネ3葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	・初期剤、一発処理剤との体系で使用する。 ・稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
4・2・27	フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ベンゾビシクロン	ウィードコア1キロ粒剤	一年生雑草				○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
0・2	ダイムロン・ペノキススラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	水田一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	
33・27	シクロピリモレート・テフリルトリオン	ルナクロス1キロ粒剤		○	○		○	○	○									イネ3葉期～出芽後50日(但し、収穫45日前まで)	○				・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	テフリルトリオン・ペノキススラム	ワイドショット1キロ粒剤	水田一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○				
2・27	ペノキススラム・ベンゾビシクロン	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○				○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	
		テッケンジャンボ ニトウリュウジャンボ	一年生雑草			○	○	○	○			○	○				○	イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)				○	
2・2・27	アジムスルフロン・ペノキススラム・メソトリオン	アトカラSジャンボMX セカンドショットSジャンボMX	一年生雑草			○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)					
2・2	ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン	アレイルSC	一年生雑草				○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで) ※出穂始期15日前まで					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	一年生雑草			○	○	○	○	○	○	○	○					イネ5葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
1・6	シハロホップブチル・ベンタゾンナトリウム塩	クリンチャーバスME液剤	一年生雑草			○	○	○	○									は種後10日～ノビエ5葉期(但し、収穫50日前まで)				○	・散布液は使用当日に調製する。 ・重複散布を避ける。 ・高温が予想される時の使用は避ける。 ・展着剤は加用しない。 ・他剤とは混用しない。DCPA剤との近接散布は避ける。 ・効果が現れるまで10～14日要するので、誤まって散き直しをしない。
6・1	ベンタゾン・メタミホップ	トドメバスMF液剤	一年生雑草			○	○	○	○									は種後10日～ノビエ6葉期まで(但し、収穫50日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤(ナトリウム塩)			○	○	○	○	○	○	○							は種後35～50日(但し、収穫50日前まで)				○	