

除草2-3. 大麦除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	多年生雑草	一年生雑草	グー サ、キク・ アブラナ科 を除く)	一年生雑草 (イネ科を除く)	一年生 広葉雑草	スズ メノ テツ ポウ	県推奨使用時期	備考
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ		○					耕起又はは種前(雑草生育期) は種後出芽前(雑草生育期)	汎用除草剤の項参照
15 3 5	ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニユロン	クリアターン乳剤		○					は種直後(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照
3 5	ペンディメタリン・リニユロン	カイタック乳剤		○					は種直後(雑草発生前)	
12 3	ジフルフェニカン・トリフルラリン	ガレース乳剤		○					は種後出芽前(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照
15 5	プロスルホカルブ・リニユロン	ムギレンジャー乳剤		○					は種後出芽前(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照 ※ 少量散布の場合は専用ノズルを使用し、土壌の全面に均一に散布すること。
5 15	プロメトリン・ベンチオカーブ	サターンバアロ粒剤		○					は種後～出芽前(雑草発生前) 生育初期(大麦の4葉期まで、スズメノテツポウ1.5葉期まで)	砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので、下限薬量で使用する。
15	プロスルホカルブ	ボクサー		○					は種後～麦2葉期(雑草発生前～発生始期)	
12 15	ジフルフェニカン・フルフェナセット	リベレーターG		○					は種後～麦2葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	砂質土壌での使用は薬害を生じる恐れがあるので避ける。
		リベレーターフロアブル		○					は種後～麦3葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	①出芽期の使用では、高薬量で薬害を生じる場合があるので注意する。 ②砂質土壌での使用は薬害を生じる恐れがあるので避ける。