BLASTAMによる葉いもち感染好適条件判定結果（2024年6月21日現在）

○BLASTAM（ブラスタム）とは

アメダスデータ観測地点における気温・降水量・日照時間・風速のデータから葉いもちの感染好適日を判定するシステムです。

○概要

・ ５月第６半旬、６月第２、４半旬に県内で好適条件の出現がありました。
・ ６月17日に平年（６月４日）より遅く梅雨入りしました。

＜対策＞
・ 不要な置き苗は、すみやかに処分する。
・ 移植までにいもち剤を使用していないほ場では、発生がないかほ場をよく観察する。

アメダス	５ 月						６ 月																	
地 点	26					31	1						6						11						16					20
須佐	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	△		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	●	ー	ー	
萩	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
油谷	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	●	ー	ー	
徳佐	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	△	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
秋吉台	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
広瀬	ー	ー	●	ー	ー	△	△	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	●		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
豊田	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	●		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
山口	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
岩国	ー	ー	ー	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	？	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
防府	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
下松	ー	ー	ー	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
玖珂	ー	ー	ー	△	ー	△	△	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	△		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	？	ー	
下関	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
柳井	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	
安下庄	ー	ー	ー	ー	ー	△	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	

出典　一般社団法人　日本植物防疫協会

○上記表の見方

凡例	●:好適条件	△:準好適条件				ー	？
内容	湿潤時間中の平均気温が15～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲	湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い	湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃の範囲外	湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間平均気温が25℃以上	湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間平均気温が20℃未満	好適条件なし	判定不能

●印がついている日は、葉いもちの感染好適条件が出現した日（感染好適日）を示す。好適条件が出現すると5～10日後に発病すると推定されます。
△印がついている日は、葉いもちに感染するには一部の条件が不足し、やや不適であった日を示します。

○注意事項

感染好適条件が出現したとしても、防除（箱粒剤等）、イネの品種、肥培管理等によって感染、発病しない場合もあります。

感染好適条件が出現しない場合でも、ほ場条件（山際、風通しが悪いなど）で感染に好適な条件となっている可能性があるので、ほ場を十分に見回りましょう。