


漁業者の皆様へ
宇部市及び山口市沿岸で魚類を斃死させる
カレニア ミキモトイが発生しています！

発 生 日	令和8年(2026年)7月31日(金)
発 生 海 域	宇部市、山口市沿岸
赤 潮 構 成 種	カレニア ミキモトイ (<i>Karenia mikimotoi</i>) (好適水温: 22~27℃、好適塩分: 20~30psu)
着色海域の色	暗褐色



大きさ: 25~35 μm × 23~33 μm

調 査 結 果		
主な観測場所	細胞数	備 考 (採水時間等)
美濃が浜	110 個/ml	8月3日 6:00 -℃ 水深 0.0m
山口漁港	2,200 個/ml	8月3日 9:00 28.6℃ 水深 0.0m
妻崎漁港	0 個/ml	8月3日 9:50 28.0℃ 水深 0.5m
宇部市場前	0 個/ml	8月3日 10:16 27.5℃ 水深 0.5m
新宇部漁協前	0 個/ml	8月3日 10:22 28.0℃ 水深 0.5m
宇部岬支店前	3,383 個/ml	8月3日 10:39 28.0℃ 水深 0.5m
長生炭鉱跡地周辺	78 個/ml	8月3日 11:00 28.5℃ 水深 0.0m
床波漁港	10 個/ml	8月3日 11:05 26.5℃ 水深 0.5m
東岐波支店前	0 個/ml	8月3日 11:25 27.0℃ 水深 0.5m
吉佐支店山口支所前	7,233 個/ml	8月3日 12:02 27.0℃ 水深 0.5m
大海支店前	2,106 個/ml	8月3日 12:22 27.1℃ 水深 0.5m

【赤潮注意報: 100 個/ml 以上、赤潮警報 (魚類斃死目安): 5,000 個/ml】

特 記 事 項

- 本種は過去、**本県で最も大きな漁業被害が発生**したプランクトンです。
- 本種は中層・底層を中心に増殖し、パッチ状になって上下動を繰り返すことから、海面からの観察では海水の着色が判別しにくいプランクトンです。
- このため、**海面が着色していなくても、魚介類の斃死を起こすことがあります**ので、十分に注意して下さい。
- また、**室内実験ではアワビは 150 個/ml で衰弱、死亡が確認**されています。

留 意 事 項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活けバ出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。

○なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類の斃死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。

○また、赤潮による漁獲物の斃死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等を行わず（被害数量等の確認が必要のため）、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。

→ <https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>