野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	株腐病	菌核病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	ピシウム腐敗病	根朽病													備考
は種前・殺菌剤																							
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○			○	○															
			フロンサイド粉剤	○			○	○															
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○																			
			ネビリュウ	○																			
36		フルスルファミド	ネビライト粉剤	○																			
育苗期・殺菌剤																							
32		ヒドロキシイソキサゾール	タチガレファイト液剤						○														出芽時～育苗期
育苗期後半・殺菌剤																							
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル				○	○		○													育苗期後半～定植当日
定植前・殺菌剤																							
3		シメコナゾール	モンガリット粒剤			○																	
			オラクル顆粒水和剤	○																			土壌混和での使用回数は2回以内であるが、そのうちの1回はおとり植物との同時使用を前提としている。作物の作付前の土壌混和処理での使用は1回に限る。
		シアゾファミド	ランマンフロアブル	○																			定植前日～当日
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○		○	○	○															
			フロンサイド粉剤	○			○	○															
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○			○																
			ネビライト粉剤	○			○																
			ネビリュウ	○																			
定植時・殺菌剤																							
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤		○																		

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	株腐病	菌核病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ネキリムシ類	カブラヤガ	アブラムシ類	ケラ	コガネムシ類幼虫	アザミウマ類	ネギアザミウマ	タネバエ	カブラハバチ	ウワバ類	備考
は種前・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5						○			○				○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
は種時・殺虫剤																								
	4A	クロチアニジン	ダントツ粒剤									○				○				○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○			○	○			○			○					は種覆土後～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル						○	○	○	○	○	○		○				○				は種時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
育苗期・殺虫剤																								
	4A	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤													○								ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤													○				○				地床育苗。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
育苗期後半・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5						○			○	○			○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			アクタラ顆粒水溶剤													○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤						○			○	○	○		○				○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	5	スピネトラム	ディアナSC																○					ミツバチに対して影響あり
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5						○	○	○	○	○	○								○	○	育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC						○	○	○	○	○	○		○			○				○	シロイチモジヨトウにも適応あり 育苗期後半～定植当日
			プリロッソ粒剤						○			○	○			○			○					育苗期後半～定植時
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル						○	○		○	○	○		○			○					育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり
	4A 28	アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤						○	○		○	○			○				○				育苗期後半～定植当日
		クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル						○	○	○	○	○			○				○				育苗期後半～定植当日。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	株腐病	菌核病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ネキリムシ類	カブラヤガ	アブラムシ類	ケラ	コガネムシ類幼虫	アザミウマ類	ネギアザミウマ	タネバエ	カブラハバチ	ウワバ類	備考
定植前・殺虫剤																								
	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤						○	○		○	○			○								定植前日～定植当日
キャベツ・定植まで　殺虫剤																								
	2B	フィプロニル	プリンス粒剤						○			○												
	4A	ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤						○			○	○			○								ミツバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○			○	○			○			○					ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があり
定植時・殺虫剤																								
	1B	アセフェート	オルトラン粒剤						○		○		○	○		○			○					ミツバチに対して影響あり
			ジェイエース粒剤						○		○		○			○								ミツバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5											○			○	○			○			ミツバチに対して影響あり
		イソキサチオン	ネキリエースK											○										ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)											○										ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5									○				○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤						○			○	○			○								ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤						○				○			○								
		クロチアニジン	ダントツ粒剤						○			○	○			○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○			○	○			○			○					ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があり

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	菌核病	株腐病	黒腐病	軟腐病	ピシウム腐敗病	灰色かび病	根朽病	黒斑病												備考
キャベツ・定植後・殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤		○	○					○													
10 1		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤		○																			
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤		○																			
1 M05		ベノミル・TPN	ダコレート水和剤	○	○						○													
2		プロシミドン	スミレックス水和剤		○																			
3		テブコナゾール	オンリーワンフロアブル		○																			キャベツに使用する場合、重複散布を避ける
M03 4	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ	○																				
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○					○															
7		ベンチオピラド	アフェットフロアブル		○	○				○	○													
		ボスカリド	カンタスドライフロアブル		○	○						○												
		イソピラザム	ネクスターフロアブル		○	○					○													
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル		○	○					○													
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル		○																			
		インピルフルキサム	カナメフロアブル		○	○																		
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○	○	○						○												
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○																		
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○	○						○												
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤		○	○				○	○	○												
		マンデストロビン	スクレアフロアブル		○																			
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル	○	○	○			○															
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20		○	○																		

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	菌核病	株腐病	黒腐病	軟腐病	ピシウム腐敗病	灰色かび病	根朽病	黒斑病	黒斑細菌病											備考
キャベツ・定植後・殺菌剤																								
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤					○					○											
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル	○																				
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC	○																				
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○																				
M01		塩基性硫酸銅	クプロシールド				○						○											結球あぶらな科葉菜類で登録
		有機銅	キノンドーフロアブル				○																	
		水酸化第二銅	クミガードSC				○																	
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	○																				
			ペンコゼブ水和剤	○																				
M05		TPN	ダコニール1000	○							○													
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤		○																			
			ベルクートフロアブル		○																			
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル	○					○															
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5			○	○	○																
定植後・無人航空機・殺菌剤																								
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル		○																			
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○																		
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC	○																				

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	シロイチモジヨトウ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	カブラハバチ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コオロギ	ダンゴムシ	ナメクジ類	カタツムリ類	備考
キャベツ・定植後・殺虫剤																								
	ー	ボーベリア・バシアーナ	ボタニガードES					○																
	ー	メタアルデヒド	マイキラー(劇)																			○	○	
		メタアルデヒド	ナメクリーン3																			○	○	
	1A	NAC	デナポン5%ベイト		○								○							○	○			
		メソミル	ランネート45DF(劇)	○	○	○		○				○		○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○	○	○						○	○		※	○						※カブラハバチ幼虫で適用。ミツバチに対して影響あり
		アセフェート	オルトラン水和剤	○	○	○		○				○		○				○						
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5													○								ミツバチに対して影響あり
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA										○											ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○		○		○						○										
		トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)	○		○	○	○				○		○										
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○		○		○				○	○	○										ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤											○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)											○										ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤											○										ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○				○						○	○			○						
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○				○						○				○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル											○					○					ミツバチに対して影響あり
	4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル	○	○	○	○	○		○	○						○							
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤	○		○	○	○		○		○						○						ツマジロクサヨトウに適用あり。ミツバチに対して影響あり
		スピネトラム	ディアナSC	○	○	○	○	○	○		○							○						ハモグリバエ類にも適用あり。ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤	○	○	○	○	○	○			○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		レピメクチン	アニキ乳剤	○	○		○	○	○	○	○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン	アファームアクセラ顆粒水和剤	○	○	○	○	○	○			○							○					
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤											○					○					
	11A	BT	エコマスターBT	○			○												○					
			ゼンターリ顆粒水和剤	○	○	○		○	○	○									○					

※ハスモンヨトウがBT剤に抵抗性を発達させている事例が多いため、使用を避けるか十分注意する。

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	シロイチモジヨトウ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	カブラハバチ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コオロギ	ダンゴムシ	ナメクジ類	カタツムリ類	備考
キャベツ・定植後・殺虫剤																								
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)	○	○	○	○	○	○	○		○												ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)	○			○	○						○								○		
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤	○	○	○	○	○				○												
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○	○	○	○	○	○	○		○						○						
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤	○	○	○		○				○												
		ルフェヌロン	マッチ乳剤	○	○	○	○	○																
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○		○																	
		テブフェノジド	ロムダンフロアブル		○			○		○														
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○			○	○						○				○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ハチハチフロアブル(劇)	○			○	○						○				○						
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF	○	○	○	○	○		○	○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル	○	○	○	○	○	○		○				○									ミツバチに対して影響あり
			アクセルベイト		○								○							○				ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○				○						○				○						マルハナバチに対して影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤	○	○	○	○	○	○		○													
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5	○	○	○	○	○	○		○													
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○						ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○						ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF											○										
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤	○	○	○	○	○	○	○	○							○						
		ブロフラニリド	ブロフレアSC	○	○	○	○	○	○	○	○													ミツバチに対して影響あり
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)	○				○										○						
			アベンジャーフロアブル(劇)	○				○										○						
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○								○					
	5 18	スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル	○	○	○	○	○				○												
	28 4A	クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル	○	○	○	○	○	○					○										ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	11A	バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素	ゼンターリ顆粒水和剤	○	○	○		○	○	○									○					

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	シロイチモジヨトウ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	カブラハバチ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コオロギ	ダンゴムシ	ナメクジ類	カタツムリ類	備考
定植後・無人航空機・殺虫剤																								
	3A	エトフェンプロックス	トレボンエアー			○		○						○										ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)											○										ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
	4A	ジノテフラン	スタークル液剤10											○										
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤	○	○	○	○	○				○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤											○										
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF	○	○	○	○	○		○	○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○						
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○						ミツバチに対して影響あり
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5	○	○	○	○	○	○		○													