野菜7．ほうれんそう

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病（ピシウム菌）	苗立枯病（リゾクトニア菌）	立枯病	べと病	根腐病	白斑病	アブラムシ類	タネバエ	コナダニ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ネキリムシ類											備考
は種前・殺菌剤																									
114		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤				○		○																
32		ヒドロキシイソキサゾール	タチガレン粉剤			○		○																	は種3日前～直前
は種時・殺菌剤																									
3		シメコナゾール	モンガリット粒剤		○																				
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤		○																				
32		ヒドロキシイソキサゾール	タチガレン液剤			○																			は種直後

野菜7．ほうれんそう

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病（ピシウム菌）	苗立枯病（リゾクトニア菌）	立枯病	べと病	根腐病	白斑病	アブラムシ類	タネバエ	コナダニ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ネキリムシ類											備考
は種前・殺虫剤																									
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)										○	○											ミツバチに対して影響あり
は種時・殺虫剤																									
	1B	イソキサチオン	カルホス微粒剤F(劇)								○														
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5							○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤							○															ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤							○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	13	クロルフェナピル	コテツベイト										○												は種時～2葉期まで

野菜7．ほうれんそう

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	白斑病	立枯病																	備考
は種後・殺菌剤																							
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル	○																			
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル	○																			
		ジメトモルフ	フェスティバル水和剤	○																			
43 40		フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル	○																			
M01		銅	コサイド3000	○	○																		
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル	○		○																	
		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	ｵﾛﾝﾃﾞｨｽｳﾙﾄﾗSC	○																			

野菜7．ほうれんそう

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	シロオビノメイガ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	タネバエ	マメハモグリバエ	ハダニ類	ハクサイダニ	コナダニ類	ケナガコナダニ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ハモグリバエ類	アシグロハモグリバエ	ウリハムシモドキ			備考
は種後・殺虫剤																								
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)	○		○					○													施設内では使用しない。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○												○						ミツバチに対して影響あり
		MEP	スミチオン乳剤	○														○						幼苗期には薬害を生ずるおそれがあるので注意する。ミツバチに対して影響あり
	3A	ペルメトリン	アディオン乳剤	○											○									ミツバチに対して影響あり
			ガードベイトA					○																ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○					○												○			ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	○																	○			ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○																				
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○																	○			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○																				ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤				○		○											○				ミツバチに対して影響あり
		スピネトラム	ディアナSC		○		○		○						○			○	○					ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○													○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		レピメクチン	アニキ乳剤		○																			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜7. ほうれんそう

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	シロオビノメイガ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	タネバエ	マメハモグリバエ	ハダニ類	ハクサイダニ	コナダニ類	ケナガコナダニ類	ホウレンソウケナガコナダニ	ハモグリバエ類	アシグロハモグリバエ	ウリハムシモドキ			備考
は種後・殺虫剤																								
	10B	エトキサゾール	ネコナカットフロアブル														○							
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)															○						葉に白化などの薬害を生じるおそれがあるので、必ず使用時期を守る。ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
			コテツベイト															○						
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)				○				○									○				高温時の散布は薬害の恐れがあるので避ける
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○		○						○					○		○				
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤			○																		
	18	テブフェノジド	ロムダンフロアブル		○																			
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○																			
	21A	フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル											○										
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○		○														○			ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○														○						
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○		○																	
		シアントラニリプロール	ベリマークSC	○	○		○																	
	29	フロニカミド	ウララDF	○																				
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤		○				○															
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)						○															
			アベンジャーフロアブル(劇)						○															
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○														○					シロイチモジヨトウ