野菜9．はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根くびれ病	根こぶ病	黄化病	尻腐病	軟腐病	菌核病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	ピシウム腐敗病	アブラムシ類	コナガ	ヨトウムシ	アオムシ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	ケラ	ハスモンヨトウ	カブラハバチ	備考
定植まで																								
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル						○	○														育苗期後半～定植当日
21		アミスルブロム	オラクル粉剤		○						○													土壌混和での使用回数は2回以内であるが、そのうちの1回はおとり植物との同時使用を前提としている。作物の作付前の土壌混和処理での使用は1回に限る。
		アミスルブロム	オラクル顆粒水和剤		○																			
		シアゾファミド	ランマンフロアブル		○																			定植前日～当日
29		フルアジナム	フロンサイドSC		○		○	○																定植前
		フルアジナム	フロンサイド粉剤		○	○																		は種又は定植前
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤		○																			は種又は定植前
		フルスルファミド	ネビリュウ		○																			播種又は定植前
36		フルスルファミド	ネビライト粉剤		○																			は種前又は定植前
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5													○			○		○			は種時又は定植時。ミツバチに対して影響あり
	1B	アセフェート	オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤									○	○	○	○	○								定植時
		イソキサチオン	ネキリエースK													○				○				は種時又は定植時～生育初期(但し、収穫14日前まで)
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA													○								は種時～生育初期 。ミツバチに対して影響あり
		テフルトリン	フォース粒剤(劇)													○								定植時。ミツバチに対して影響あり
	14	トルクロホスメチル	リゾレックス粉剤				○																	定植前

野菜9．はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根くびれ病	根こぶ病	黄化病	尻腐病	軟腐病	菌核病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	ピシウム腐敗病	アブラムシ類	コナガ	ヨトウムシ	アオムシ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	ケラ	ハスモンヨトウ	カブラハバチ	備考
定植まで																								
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5									○	○		○									は種前 育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤									○												育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤									○	○		○		○							定植時。ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤									○	○		○		○							定植時 定植前日～定植当日
		クロチアニジン	ダントツ粒剤									○	○		○	○	○							は種時 、育苗期後半、定植時。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5										○	○	○		○						○	育苗期後半～定植当日
	28	シアントラニリプロール	ベリマークSC									○	○		○		○					○	○	カブラハバチ類で適用 育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル									○	○	○	○	○	○					○		育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。
		クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル									○	○	○			○	○				○	○	ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤									○	○		○		○	○					○	は種覆土後～育苗期後半。 ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜9. はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	べと病	菌核病	白さび病	白斑病	黒斑病	黒斑細菌病	軟腐病	ピシウム腐敗病	根こぶ病	尻腐病	炭疽病										備考
定植後・殺菌剤																									
NC		シュードモナス ロデシア	マスタピース水和剤							○	○														
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤			○		○							○										
		ベノミル	ベンレート水和剤			○		○							○										
101		チオファネートメチル・ジエトフェンカルブ	ゲッター水和剤			○																			
1M05		ベノミル・TPN	ダコレート水和剤		○	○			○																
4M03	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ		○							○													
4M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド		○		○					○													
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル			○		○	○																
		イソピラザム	ネクスターフロアブル					○	○					○											
		ペンチオピラド	アフェットフロアブル			○		○	○					○											
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル			○			○																
		インピルフルキサム	カナメフロアブル			○								○											
117		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG		○	○	○	○	○					○	○										
7M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー		○	○	○	○	○																ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル		○		○	○	○																薬害を生じやすいので注意事項を厳守する。
		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル		○			○	○																①結球後期までの散布、②浸透性を高める効果のある展着剤を混用、で薬害を生じる場合がある。結球後期までの散布を避け、事前に混用適否を確認する。
		マンデストロビン	スクレアフロアブル			○									○										
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル		○		○	○	○																
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤			○		○	○						○										
1127		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル		○		○																		
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤											○											
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤						○																
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル		○		○					○	○												

野菜9．はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	べと病	菌核病	白さび病	白斑病	黒斑病	黒斑細菌病	軟腐病	ピシウム腐敗病	根こぶ病	尻腐病	炭疽病										備考
定植後・殺菌剤																									
25		ストレプトマイシン	アグレプト水和剤								○														高温時または幼苗時は薬害の影響が大きいので、使用を避ける。
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤							○	○														
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル		○																				
		ジメトモルフ	フェスティバル水和剤		○																				
43 40		フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル		○		○																		
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル		○																				
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC		○																				
49 11		オキサチアピプロリン・ファモキサドン	ゾーベック　エンカンティアSE		○																				
21 49		アミスルブロム オキサチアピプロリン	ゾーベックエンテクタSE		○																				
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤		○		○	○	○																
M01		有機銅	キノンドーフロアブル								○														
		塩基性硫酸銅	ムッシュボルドーDF								○														
		水酸化第二銅	クミガードSC								○														
M04 M01		キャプタン・有機銅	オキシラン水和剤						○		○														
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤		○			○	○																
			ペンコゼブ水和剤		○			○	○																
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○	○			○	○						○										
M05		TPN	ダコニール1000		○		○	○	○																
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル		○		○					○													
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5							○	○														

野菜9．はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	オオタバコガ	コオロギ	アザミウマ類	ダンゴムシ	ネギアザミウマ	ナモグリバエ	ナメクジ類	ダイコンハムシ	シロイチモジヨトウ	備考

定植後・殺虫剤

	1A	NAC	デナポン5%ベイト			○						○				○		○						
		メソミル	ランネート45DF(劇)	○	○		○		○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○	○	○	○				○	※			○							※カブラハバチ幼虫で適用。ミツバチに対して影響あり
		アセフェート	オルトラン水和剤	○	○	○	○		○					※										※カブラハバチで適用
	3A	エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○	○		○		○															ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン粉剤DL		○				○															ミツバチに対して影響あり
		トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)	○	○		○	○	○															ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○	○		○		○															ハクサイダニ
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○																				ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	○									○									○		ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○	○				○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○	○				○					※										※カブラハバチで適用
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○																				ミツバチに対して影響あり
	4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル		○	○	○	○	○	○			○	○								○	○	
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○		○	○	○	○				○										ミツバチに対して影響あり
		スピネトラム	ディアナSC		○	○	○	○	○	○					○		○							ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○		○		○						○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○		○	○				○	○	○							○		ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	6 15	エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤	ｱﾌｧｰﾑｴｸｾﾗ顆粒水和剤		○	○			○						○									
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○																				
	11A	BT	フローバックDF エコマスターBT					○		○														
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○		○		○					※										※カブラハバチで適用 ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)	○	○				○					○							○			

野菜9．はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	オオタバコガ	コオロギ類	アザミウマ類	ダンゴムシ	ネギアザミウマ	ナモグリバエ	ナメクジ類	ダイコンハムシ	シロイチモジヨトウ	備考
定植後・殺虫剤																								
		クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○	○	○		○		○													ハクサイの苗期、特に軟弱徒長苗には使用しない(薬害)。
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○		○		○															
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤		○		○		○		○													
		ルフェヌロン	マッチ乳剤		○				○															
		メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル				○		○															
	18	テブフェノジド	ロムダンフロアブル			○			○															
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル				○																	
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○	○			○	○												○			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ハチハチフロアブル(劇)	○	○			○	○				○								○	○		
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○		○	○	○	○				○									○	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○	○	○	○	○				○	○								○		ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルベイト			○						○				○								
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○	○																			
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○	○	○	○	○					○	○									
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○	○		○						○									
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○	○	○	○	○	○			○										○	ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○	○	○					○	○								○	ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○																				
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤		○	○	○	○	○	○					○		○						○	
		ブロフラニリド	ブロフレアSC		○	○	○	○	○				○	○	○							○	○	カブラハバチ類で適用
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)		○				○															
			アベンジャーフロアブル(劇)		○				○															
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○		○		○						○									
	5 18	スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル		○		○		○															
	4A 28	クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル	○	○	○	○	○																ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤	○	○			○	○															