野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	亀裂褐変症（リゾクトニア菌）	根こぶ病	白さび病	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	コナガ	アオムシ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	タネバエ	ダイコンバエ	ケラ	ハイマダラノメイガ	カブラハバチ類					備考
は種前・殺菌剤																								
29		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
			フロンサイドSC	○																				
114		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤			○																		
は種前・殺虫剤																								
7		フルオピラム	ネマクリーン粒剤 ビーラム粒剤				○	○																
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤		○																			
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)				○	○				○												
	1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤				○	○																
		イミシアホス	ネマキック粒剤				○																	
		アセフェート	オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤						○	○		○												
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○			○	○		○							ミツバチに対して影響あり 播種時。ヒメダイコンバエにも適用あり。
		カズサホス	ラグビーMC粒剤				○	○					○											
は種時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5										○											は種時及び生育期 。ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン粒剤	フォース粒剤(劇)										○		○									ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン粒剤	ガードベイトA								○													は種時～生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤									○	○											ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤									○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤						○			○												
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5									○												つまみ菜、間引き菜には使用しない。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	亀裂褐変症（リゾクトニア菌）	白さび病	ワッカ症	黒斑細菌病	軟腐病	腐敗病	白斑病	炭疽病													備考
は種後・殺菌剤																								
11		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル		○	○																		
		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル		○	○																		
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル		○																			
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル		○	○																		
24 M01		カスガマイシン・銅	カスミンボルドー			○	○	○																
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル		○	○																		
U18		バリダマイシン	バリダシン粉剤DL	○																				
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤					○																
M01		銅	Zボルドー		○		※	※																※「野菜類」で登録
		銅	コサイド3000		○																			
		塩基性硫酸銅	フジドーLフロアブル		○		○																	
M05		TPN	ダコニール1000		○	○				○	○													
定植後・無人航空機・殺菌剤																								
M01		銅	Zボルドー		○		○	○																
		塩基性硫酸銅	フジドーLフロアブル		○		○																	

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	ハモグリバエ	ナモグリバエ	ダイコンハムシ	ナメクジ類	タネバエ	タマナギンウワバ			備考
は種後・殺虫剤																								
		NAC	デナポン5%ベイト							○														
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)	○			○	○			○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○	○	○			○	○	※	○										※カブラハバチ幼虫で適用。ミツバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5							○		○												ミツバチに対して影響あり
	3A	エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○		○		○			○													ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン粉剤DL					○										○						ミツバチに対して影響あり。※ダイコンサルハムシ」で適用(ダイコンハムシと同じ)。
		テフルトリン	フォース粒剤(劇)									○												つまみ菜、間引き菜には使用しない。ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)								○													ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○				○			○	○	※					※						カブラハバチで適用※ダイコンサルハムシ」で適用(ダイコンハムシと同じ)。
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤								○													つまみ菜、間引き菜には使用しない。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤								○							○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤								○	○						○						ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤									○								○				生育期(但し、収穫30日前まで)
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル								○													ミツバチに対して影響あり
	4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル	○		○	○	○				○	○					○						
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤	○				○				○												ミツバチに対して影響あり
		スピネトラム	ディアナSC	○		○	○	○	○			○	※		○									カブラハバチで登録。ミツバチに対して影響あり
	6	レピメクチン	アニキ乳剤	○			○	○					○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤	○			○	○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	11A	BT	エコマスターBT				○																	
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)	○				○										※						※ダイコンサルハムシ」で適用(ダイコンハムシと同じ)。ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)	○				○			○	○	○		○			○						
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤	○	○	○		○				○												ダイコンの根部肥大開始以前(12葉期以前)の使用は避ける(薬害)
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○			○	○																
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤	○		○		○																
		ルフェヌロン	マッチ乳剤	○				○																

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	ハモグリバエ	ナモグリバエ	ダイコンハムシ	ナメクジ類	タネバエ	タマナギンウワバ			備考
は種後・殺虫剤																								
	18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル			○	○																	
		メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル			○		○																
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○			○	○			○	○	※				○	○						※カブラハバチで適用。白さび病、ワッカ症にも適用あり。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF	○		○	○	○					○											
	22B	メタフルミゾン	アクセルベイト							○														ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルフロアブル			○	○					○	○					○						ミツバチに対して影響あり。「ダイコンサルハムシ」として登録」(ダイコンハムシと同じ)。
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤	○			○																	
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5	○		○	○	○					○		○									
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○		○	○	○			○	○	○		○			○						ミツバチに対して影響あり。
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤	○			○	○				○	○											※カブラハバチで適用。
		ブロフラニリド	ブロフレアSC	○		○	○	○				○	○					○						
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)	○																				
			アベンジャーフロアブル(劇)	○																				
	5 18	スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル	○				○																
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル	○		○		○					※											※カブラハバチで適用
定植後・無人航空機・殺虫剤																								
	3A	エトフェンプロックス	トレボンエアー			○		○			○													ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	スタークル液剤10								○													ミツバチに対して影響あり
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○			○	○																
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD	○		○	○	○			○	○	○		○			○						ミツバチに対して影響あり。