野菜13. にんじん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	黒葉枯病	根腐病	軟腐病	斑点病	うどんこ病	菌核病	しみ腐病	斑点細菌病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	白絹病										備考
は種前・殺菌剤																							
2		イプロジオン	ロブラール水和剤	○																			
11 4		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤		○					○													
は種時・殺菌剤																							
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤		○							○											
は種後・殺菌剤																							
M01 BM02		水酸化第二銅・バチルスズブチリス	クリーンカップ	○																			
2		イプロジオン	ロブラール水和剤	○			○																
		プロシミドン	スミレックス水和剤						○														
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤					○															
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○			○	○	○				○										
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○																			
		インピルフルキサム	カナメフロアブル（劇）				○																
11		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル	○			○																
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤	○			○	○	○														
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル	○									○										
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○			○	○	○	○													
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20						○														
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水和剤	○																			
24 M01		カスガマイシン・銅	カスミンボルドー カッパーシン水和剤	○		○					○												
29		フルアジナム	フロンサイド水和剤	○																			
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤			○					○												
M01		銅	Zボルドー	○																			
			コサイド3000	○																			炭酸カルシウム水和剤（クレフノンなど）を加用する
		水酸化第二銅	クミガードSC	○																			
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	○																			
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○					○														
			ベルクートフロアブル	○			○	○	○														
M05		TPN	ダコニール1000	○																			
定植後・無人航空機・殺菌剤																							
M01		銅	Zボルドー	○		○																	

野菜13. にんじん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	キアゲハ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	ネキリムシ類	ヤサイゾウムシ	アブラムシ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	コガネムシ類幼虫	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	ヒョウタンゾウムシ類	クロバネキノコバエ類	コオロギ類						備考
は種前・殺虫剤																							
7		フルオピラム	ネマクリーン粒剤 ビーラム粒剤										○	○									
	1B	イミシアホス	ネマキック粒剤										○	○									
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)				○									○							ミツバチに対して影響あり
は種時・殺虫剤																							
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)				○																ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5									○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
は種後・殺虫剤																							
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)		○	○			○							○							施設内では使用しない。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	イソキサチオン	ネキリエースK				○																発芽期～生育初期（但し、収穫14日前まで）
		PAP	エルサン乳剤(劇)		○	○			○														ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤						○						※	○							※トビイロヒョウタンゾウムシで適用。ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○					○														
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤							○													ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤			○				○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)	○	○										○								ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○											○							
	18	テブフェノジド	ロムダンフロアブル	○	○																		
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル			○									○								ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルベイト			○	○										○						ミツバチに対して影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○																		
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○	○			○														ミツバチに対して影響あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル			○																	