野菜15. ブロッコリー

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	菌核病	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ	ケラ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コガネムシ類幼虫			備考
は種前・殺菌剤																								
29		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○																				
			ネビライト粉剤	○																				
			ネビリュウ	○																				
定植前・殺菌剤																								
21		アミスルブロム	オラクル粉剤	○																				混和での使用回数は2回以内であるが、そのうちの1回はおとり植物との同時使用を前提としている。 作物の作付前の土壌混和処理での使用は1回に限る。
		アミスルブロム	オラクル顆粒水和剤	○																				
		シアゾファミド	ランマンフロアブル	○																				定植前日～当日
29		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
			フロンサイドSC	○																				
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○																				
			ネビライト粉剤	○																				
			ネビリュウ	○																				
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル			○																		「はなやさい類」で登録 育苗期後半～定植当日
定植時・殺菌剤																								
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤		○																			
は種時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5											○				○			○			ミツバチに対して影響あり
	2B	フィプロニル	プリンス粒剤							○														
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5				○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤							○					○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤				○			○	○				○				○					は種覆土後～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜15. ブロッコリー

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ	ケラ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コガネムシ類幼虫	シロイチモジヨトウ			備考
育苗期・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5			○			○	○														育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤			○			○	○				○					○					育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5			○	○			○														育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC			○	○		○	○				○				○			○			育苗期後半～定植当日
			プリロッソ粒剤オメガ			○				○				○				○						育苗期後半～定植時
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル			○	○		○	○			○	○										育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり。
	28 4A	クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル			○	○		○	○				○					○					育苗期後半～定植当日。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤			○	○			○				○					○					育苗期後半～定植当日
定植前・殺虫剤																								
	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤			○			○	○				○										定植前日～定植当日
定植時・殺虫剤																								
	1B	アセフェート	オルトラン粒剤					○		○			○					○						ミツバチに対して影響あり
			ジェイエース粒剤					○																ミツバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5										○				○			○				ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)										○											ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤			○								○										ミツバチに対して影響あり
			スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤			○								○										
		アセタミプリド	モスピラン粒剤			○				○				○										
		クロチアニジン	ダントツ粒剤			○			○	○				○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤			○			○	○				○				○						ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	1B	イソキサチオン	ネキリエースK									○												定植時～生育初期(但し、収穫14日前まで)

野菜15. ブロッコリー

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	軟腐病	黒腐病	黒斑細菌病	花蕾腐敗病	菌核病	黒すす病	根朽病	根こぶ病												備考
定植後・殺菌剤																								
NC		シュードモナス　ロデシア	マスタピース水和剤		○		○	○																
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤						○															
			トップジンMゾル						○															
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○																				
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル						○	○														「はなやさい類」で登録
		ペンチオピラド	アフェットフロアブル						○	○	○													
		インピルフルキサム	カナメフロアブル						○	○														
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○					○	○														
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○					○	○														
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤						○	○														
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル	○					○	○														
		マンデストロビン	スクレアフロアブル						○	○														
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○					○	○														
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20						○															
7		イソフェタミド	ケンジャフロアブル						○	○														
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル	○								○												
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤		○		○	○																
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル	○																				
40 M05		ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○																				
49 40		オキサチアピプロリン マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC	○																				
U01 7		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル	○																				
M01		銅	Zボルドー			○		○																
			コサイド3000					○																
			クプロシールド				○	○																
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5		○	○																		
定植後・無人航空機・殺菌剤																								
49 40		オキサチアピプロリン マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC	○																				
7		ピラジフルフルミド	パレード20フロアブル						○	○														
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○					○	○														
M01		銅	Zボルドー			○																		

野菜15. ブロッコリー

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ	ケラ	アザミウマ類	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	シロイチモジヨトウ				備考
	11A	BT	フローバックDF エコマスターBT				○																	
	3A	エトフェンプロックス	トレボン乳剤					○																ミツバチに対して影響あり
		トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)			○	○																	
		ペルメトリン	ガードベイトA									○												生育初期。ミツバチに対して影響あり
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)			○							○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○	○	○					○	○	※		○							※カブラハバチ幼虫で適用
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5															○						ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤										○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤										○											ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○				○					○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○				○					○				○							
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)										○											ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル										○											ミツバチに対して影響あり
	4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル	○	○	○	○	○												○				
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤	○				○																
		スピネトラム	ディアナSC	○	○	○	○	○	○	○							○			○				ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤	○	○	○		○	○															
		レピメクチン	アニキ乳剤	○	○			○												○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	6 15	エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤	ｱﾌｧｰﾑｴｸｾﾗ顆粒水和剤	○	○		○	○												○				
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤										○											
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)	○	○	○		○												○				ミツバチに対して影響あり
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)	○																				
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤	○				○			○													
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤	○																				
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○	○	○		○									○							
		ルフェヌロン	マッチ乳剤		○																			
	18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル			○																		
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○				○					○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

定植後・殺虫剤

野菜15. ブロッコリー

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ	ケラ	アザミウマ類	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	シロイチモジヨトウ				備考
定植後・殺虫剤																								
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF	○				○		○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ファイントリムDF	○	○			○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル	○	○	○																		ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルベイト									○							○					ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○				○					○				○							マルハナバチに対して影響あり
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5	○	○		○	○	○															
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤	○	○	○	○																	
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○			○					○				○			○				ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○	○		○			○				○			○				ミツバチに対して影響あり。
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤	○	○	○	○	○	○	○							※			○				※ネギアザミウマで適用
		ブロフラニリド	ブロフレアSC	○	○	○	○	○	○	○										○				はなやさい類で登録。ミツバチに対して影響あり
	28 4A	クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル	○	○			○					○											ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル	○	○															○				
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル（劇）	○				○									○							
			アベンジャーフロアブル（劇）	○				○									○							
定植後・無人航空機・殺虫剤																								
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル（劇）										○											ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル液剤10										○											ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤	○	○	○		○	○															
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤										○											
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF	○				○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○			○					○				○			○				ミツバチに対して影響あり。
	28	テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○	○		○			○							○				
	3A	エトフェンプロックス	トレボンEW					○																
	9D	アフィドピロペン	セフィーナDC（普）(A)										○											
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤	○	○	○		○	○															