野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	つる割病	つる枯病	苗立枯病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	斑点細菌病	苗立枯病（ヒ。シウム菌）																備考
は種時・殺菌剤																									
7		フルトラニル	モンカットフロアブル40				○																		は種時～子葉展開時
32		ヒドロキシイソキサゾール	タチガレファイト液剤						○																は種直後
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5				○																		は種直後
定植前・殺菌剤																									
1		ベノミル	ベンレート水和剤	○																					定植前～定植1ヶ月後
定植時・殺菌剤																									
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤					○																	健苗に使用し、幼苗軟弱徒長苗には使用しない。

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ネキリムシ類	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	タネバエ	コガネムシ類幼虫	ウリハムシ幼虫	ケラ	ハダニ類				備考
は種前・殺虫剤																								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)	○	○																			
育苗期・殺虫剤																								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)			○						○												
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤			○																		育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤			○		○						○										ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤			○		○				○												育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル			○		○		○										○				育苗期後半～定植当日。マルハナバチに対して影響あり

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ネキリムシ類	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	タネバエ	コガネムシ類幼虫	ウリハムシ幼虫	ケラ	ハダニ類				備考
育苗期・殺虫剤																								
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5											○										育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC			○		○		○				○										育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル			○		○						○										育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤			○		○		○ ※				○										鉢上げ時～育苗期後半　※鉢上げ時(育苗培土混和)にも適用。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤			○		○		○								※						育苗期後半～定植当日 ※ウリハムシで適用
定植前・殺虫剤																								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)	○	○	○																		
	1B	アセフェート	オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤			○			○	○														ミツバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5										○			○	○		○					ミツバチに対して影響あり
		イミシアホス	ネマキック粒剤	○																				
		ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤	○																				
定植時・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5			○		○							○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤			○		○		○														ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤			○		○				○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤			○																		
	1B	アセフェート	オルトラン粒剤			○			○	○														作条散布又は植穴散布
	1B	アセフェート	オルトラン粒剤										○											植穴処理

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	つる枯病	べと病	疫病	灰色かび病	褐斑病	菌核病	黒星病	炭疽病	斑点細菌病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	つる割病									備考
定植後・殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンMペースト		○																			
			トップジンM水和剤	○	○			○		○	○	○												
		ベノミル	ベンレート水和剤		○			○		○	○	○			※									※定植前～定植後1か月（潅注）
101		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤					○	○	○		○												
2		プロシミドン	スミレックス水和剤		○			○		○														ハクサイ、ダイコン、ストックには薬害を生じる恐れがあるので付近にある場合は注意する。
3		トリホリン	サプロール乳剤 セーフガード乳剤	○																				
		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○						○													
		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤	○							○													
M034	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ			○																		発病初期の1回程度の散布とマンゼブ剤等との体系防除が効果面、耐性菌対策上有効である。
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○		○			○															
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○				○		○														
		イソピラザム	ネクスターフロアブル	○				○	○	○														
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○	○			○	○	○														
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル	○	○			○	○	○														
		インピルフルキサム	カナメフロアブル	○				○		○														
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○		○		○	○		○	○												ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること
M7 50		イミノクタジンアルベシル酸塩・ ピリオフェノン	ラミック顆粒水和剤	○				○	○															
9		メパニピリム	フルピカフロアブル	○				○	○															

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	つる枯病	べと病	疫病	灰色かび病	褐斑病	菌核病	黒星病	炭疽病	斑点細菌病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	つる割病									備考
定植後・殺菌剤																								
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○		○		○	○	○		○												薬害を生じやすいので注意事項を厳守する。
		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル	○		○			○			○												浸透性を高める展着剤を混用すると薬害を生じる場合があるので、事前に混用適否を確認する。
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤					○		○														
		マンデストロビン	スクレアフロアブル							○		○												
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○		○		○	○	○	○	○												
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20					○	○	○														
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤	○				○																
		ポリオキシンD亜鉛塩	ジオゼット水和剤	○				○																
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○																		
21 27		アミスルブロム・シモキサニル	ダイナモ顆粒水和剤			○																		
22		エタボキサム	エトフィンフロアブル			○																		
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル			○																		
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤			○																		
27 M03	UN	シモキサニル・マンゼブ	カーゼートPZ水和剤			○																		
39	21	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○		○			○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
40		ジメトモルフ	フェスティバル水和剤			○																		
40 M05		ジメトモルフ・TPN	カーニバル水和剤	○		○			○			○												
		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○		○			○		○													
43 40		フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル			○																		
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル			○																		
49 21		オキサチアピプロリン アミスルブロム	ゾーベックエンテクタSE			○																		
49 M03	UN	オキサチアピプロリン・マンゼブ	ゾーベック　エニベル顆粒水和剤			○																		
52		イプフルフェノキン	ミギワ10フロアブル		○			○		○		○												

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	つる枯病	べと病	疫病	灰色かび病	褐斑病	菌核病	黒星病	炭疽病	斑点細菌病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	つる割病										備考
定植後・殺菌剤																									
M01		有機銅	キノンドーフロアブル			○						○	○												
		DBEDC	サンヨール	○		○																			高温時には薬害が出る恐れがある。
		塩基性硫酸銅	ムッシュボルドーDF										○												
M01 BM02		銅・バチルス ズブチリス	クリーンカップ			○			○				○												
M01 M02	UN	硫黄・塩基性塩化銅	園芸ボルドー						○				○												
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤		○	○	○		○		○	○	○												
			ペンコゼブ水和剤			○			○		○	○													
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80		○	○			○			○													
M04 33		キャプタン・ホセチル	アリエッティC水和剤			○			○																
M04 M01		キャプタン・有機銅	オキシラン水和剤			○						○	○												
M05		TPN	ダコニール1000	○		○		○	○		○	○		○											
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○				○	○			○													
M07		ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	ベルクートフロアブル	○				○	○	○	○	○													
M07 11		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリベンカルブ	ファンベル顆粒水和剤	○				○	○	○	○	○													
M07 M04		イミノクタジンアルベシル酸塩・キャプタン	ダイパワー水和剤	○		○			○			○													
U06 3		シフルフェナミド・トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤	○																					
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル	○				○																	
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤	○																					高温時の薬害に注意。
			パルミノ	○																					
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル			○																			
NC M01		炭酸水素ナトリウム・銅	ジーファイン水和剤					○					○												
定植後・常温煙霧・殺菌剤																									
1		ベノミル	ベンレート水和剤					○																	「常温煙霧」は「温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等の密閉できる場所」で適用。
2		プロシミドン	スミレックス水和剤					○																	
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○																					
9		メパニピリム	フルピカフロアブル	○																					
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20					○	○	○															
M05		TPN	ダコニール1000			○																			
M07		ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	ベルクートフロアブル	○				○	○	○	○	○													
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤	○																					

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ウリハムシ	スジブトホコリダニ	ハスモンヨトウ	カメムシ類	ネコブセンチュウ	クロバネキノコバエ類				備考
定植後・殺虫剤																								
5		脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE			○		○			○	○	○											
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤					○			○													
M01		DBEDC	サンヨール	○		○					○													高温時には薬害が出る恐れがある。
	1B	イミシアホス	ネマキック液剤(劇)																○					
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○			○		○		○													
		トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)	○			○																	
		エトフェンプロックス	トレボン粉剤DL	○											○									ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○		○			○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○		○		○																外部からミツバチ及び野生ハナバチ類が入らない形態の施設等で使用する。
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	○		○		○							○			○						ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤	○		○																		ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○		○				○								○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○		○				○										○				
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○		○		○				○			○									
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○		○																		ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤					○				○	○											
		スピネトラム	ディアナSC			○		○				○	○											ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤			○		○				○	○											
		ミルベメクチン	コロマイト水和剤								○													
		レピメクチン	アニキ乳剤			○											○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アバメクチン	アグリメック(劇)			○		○			○													
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○		○																		
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○		○																		
	10A	ヘキシチアゾクス	ニッソラン水和剤								○													
	10B	エトキサゾール	バロックフロアブル								○													
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)						○	○	○	○			○									キュウリの幼苗期(1～3葉期)には薬害を生ずる場合があるので使用しない。

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ウリハムシ	スジブトホコリダニ	ハスモンヨトウ	カメムシ類	ネコブセンチュウ	クロバネキノコバエ類				備考
定植後・殺虫剤																								
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤							○		○		○										
		ジフルベンズロン	デミリン水和剤							○														
		ルフェヌロン	マッチ乳剤			○						○												
	16	ブプロフェジン	アプロード水和剤				※																	※オンシツコナジラミ幼虫で適用
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル								○													
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル								○													
	21A	ピリダベン	サンマイトフロアブル(劇)	○		○					○													
		フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル								○													
		トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○		○		○				○												皮ふに対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	21A 25B	フェンピロキシメート・ピフルブミド	ダブルフェースフロアブル								○													
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○		○		○			○													マルハナバチに対して影響あり
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル								○													
		シエノピラフェン	スターマイトフロアブル								○													
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5									○	○											
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤									○					○							
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○		○		○				○	○											ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○		○		○		○		○	○				○							ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○		○																		
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤			○		○			○	○	○				○							
	33	アシノナピル	ダニオーテフロアブル								○													銅の注意事項を記載すること
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤			○																		高温時の薬害に注意。
定植後・常温煙霧・殺虫剤																								
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○																				「温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙハウｽ等の密閉できる場所」で適用。きゅうり(施設栽培)で登録。ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり