野菜18. すいか

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病（リゾクトニア菌）	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	アブラムシ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ネキリムシ類	タネバエ	コガネムシ類幼虫	ウリハムシ幼虫	ケラ	コナジラミ類	ハモグリバエ類							備考
は種前・殺虫剤																								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)		○	○																		
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○				○									ミツバチに対して影響あり
育苗期・殺虫剤																								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)				○		○															
	4A	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤				※																	※ワタアブラムシで適用。ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル				○	○		○						○								育苗期後半～定植当日。マルハナバチに対して影響あり
	4A	アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤				○	○								○								育苗期後半～定植当日
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤				○	○								○								鉢上げ時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	28	シアントラニリプロール	ベリマークSC				○	○								○								育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル				○									○	○							育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり。
定植前・殺虫剤																								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)		○	○																		
	1B	イミシアホス	ネマキック粒剤		○																			
		ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤		○																			
定植時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○		○		○									ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5				○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤				※																	※ワタアブラムシで適用。ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤				○		○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤				○																	
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤				○																	

野菜18. すいか

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	べと病	炭疽病	褐斑細菌病	菌核病	つる枯病	疫病	褐色腐敗病												備考
定植後・殺菌剤																							
1		チオファネートメチル	トップジンMペースト						○														主茎の基部(地際から10～20cm)や病かん部を削り乾燥させ、1週間間隔で2～3回原液をそのままハケで塗布する。
		チオファネートメチル	トップジンM水和剤			○		○															
		ベノミル	ベンレート水和剤			○		○	○														
101		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤	○		○		○	○														
2		プロシミドン	スミレックス水和剤					○	○														ハクサイ、ダイコン、ストックには薬害を生じる恐れがあるので付近にある場合は注意する。
3		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤	○		○			○														
		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○					○														幼苗期に高濃度で散布すると濃緑化症状が生じることがあるので、幼苗期には所定範囲内の抵濃度で使用する。
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド			○			○		○												
M03 4	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ								○												
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○				○	○														
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○				○	○														
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル	○					○														
117		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○		○		○	○		○												蚕に対して影響があるので周辺の桑葉にはかからないようにする。
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○		○		○	○														
9		メパニピリム	フルピカフロアブル	○																			
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル			○			○														薬害を生じやすいので注意事項を厳守する。
		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル	○		○			○														浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると、薬害を生じる場合があるので事前に混用の適否を確認する。
		マンデストロビン	スクレアフロアブル			○		○	○														
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○		○		○	○		○												
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20			○		○															

野菜18. すいか

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	べと病	炭疽病	褐斑細菌病	菌核病	つる枯病	疫病	褐色腐敗病												備考
定植後・殺菌剤																							
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤	○					○														
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル								○												
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤								○												
27 M03	UN	シモキサニル・マンゼブ	カーゼートPZ水和剤						○		○												
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○																			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		トルフェンピラド	ハチハチフロアブル(劇)	○																			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル								○												
40 M03	UN	ベンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ	カンパネラ水和剤								○												
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤			○					○												
M7 50		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリオフェノン	ラミック顆粒水和剤	○				○															
M7 53		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリダクロメチル	フセキワイドフロアブル	○					○														
M01		有機銅	キノンドーフロアブル			○																	薬害軽減剤として炭酸カルシウム水和剤(クレフノン)200倍を加用する。
		DBEDC	サンヨール	○																			アブラムシ類、ハダニ類にも適用あり。高温時には薬害が出る恐れがある。
M02	UN	硫黄	イオウフロアブル	○																			
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤		○	○	○		○	○													
			ペンコゼブ水和剤			○			○		○												
M04 M01		キャプタン・有機銅	オキシラン水和剤			○			○														
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80		○	○			○														
M05		TPN	ダコニール1000			○			○														幼果期に薬害の恐れがある。
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクートフロアブル	○		○		○	○														
		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○		○		○	○														
M07 11		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリベンカルブ	ファンベル顆粒水和剤	○		○		○	○														
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤	○																			高温時の薬害に注意。
			パルミノ	○																			
U06 3		シフルフェナミド・トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤	○																			
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル	○																			
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル		○						○												

野菜18. すいか

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	ウリハムシ	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ネコブセンチュウ	コガネムシ類幼虫					備考
定植後・殺虫剤																								
	5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE				○		○															キャプタンを含む農薬またはアゾキシストロビンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。
		イミシアホス	ネマキック液剤(劇)															○						
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5																○					収穫14日前まで。ミツバチに対して影響あり
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○					○															
		エトフェンプロックス	トレボン粉剤DL							○				○										ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○		○				○			○											ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○				○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○			○																	ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○																				
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤		○																			ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	○																				ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○				○						○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○		○		○																
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○		○	○							○	○									
	4C	スルキサフロル	トランスフォームフロアブル	○		○																		
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤				○																	
		スピノサド	ダブルシューターSE			○	○		○			○												
		スピネトラム	ディアナSC			○	○			○		○			○									ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤			○	○																	
		ミルベメクチン	コロマイト水和剤						○															
		レピメクチン	アニキ乳剤									○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アバメクチン	アグリメック(劇)			○	○		○															
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○																				
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○		○																		
	10B	エトキサゾール	バロックフロアブル						○															
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)					○	○			○			○									ミツバチに対して影響あり
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤					○		○														
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤					○			○	○					○							
		ジフルベンズロン	デミリン水和剤					○																

野菜18. すいか

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	ウリハムシ	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ネコブセンチュウ	コガネムシ類幼虫					備考
定植後・殺虫剤																								
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル						○															
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル						○															
	21A	フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル						○															
		ピリダベン	サンマイトフロアブル(劇)	○		○			○															
		フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル						○															
39		トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○		○	○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○		○	○		○															マルハナバチに対して影響あり
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル						○															
		シエノピラフェン	スターマイトフロアブル						○															
	25B	ピフルブミド	ダニコングフロアブル						○															
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤							○		○			○									
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5									○				○								
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○		○	○			○		○			○	○								ミツバチに対して影響あり。
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤			○	○		○	○		○			○	○								
	21A 25B	フェンピロキシメート・ピフルブミド	ダブルフェースフロアブル						○															
	33	アシノナピル	ダニオーテフロアブル						○															
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)				○																	
	34	フロメトキン	アベンジャーフロアブル				○																	
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル				○			○		○			○									
	5	脂肪酸グリセリド スピノサド	ダブルシューターSE(普)(A)			○	○		○			○												
	6	アバメクチン	アグリメック			○	○		○															