野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	根腐萎凋病	青枯病	萎凋病	ネキリムシ類	ネキリムシ	コガネムシ類幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	トマトハモグリバエ	アザミウマ類	トマトサビダニ	ネコブセンチュウ	ハスモンヨトウ			備考
は種時・殺菌剤																								
7		フルトラニル	モンカットフロアブル40		○																			は種時～子葉展開時
M05		TPN	ダコニール1000		○																			
育苗期・殺菌剤																								
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○																				は種後から2～3葉期
定植前・殺菌剤																								
1		ベノミル	ベンレート水和剤					○																定植前～定植1ケ月後
	1B	イミシアホス	ネマキック粒剤																	○				
	1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤																	○				
	1B	カズサホス	ラグビーMC粒剤																	○				
定植時・殺菌剤																								
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤		○																			
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5						○		○	○												ミツバチに対して影響あり

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	根腐萎凋病	青枯病	萎凋病	ネキリムシ類	ネキリムシ	コガネムシ類幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	トマトハモグリバエ	アザミウマ類	トマトサビダニ	ネコブセンチュウ	ハスモンヨトウ	トマトキバガ		備考
は種前・殺虫剤																								
	4A	ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤											○										ミツバチに対して影響あり
育苗期・殺虫剤																								
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA						○															生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5											○										育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤											○										育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤											○	○									ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤											○										鉢上げ時。ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○				○						アザミウマ類のみ育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5											○	○							○		育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC										○	○	○			○				○		育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル										○	○	○									育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり。
	4A 28	アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤										○	○	○									育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○				○	○	○			○			○			鉢上げ時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
定植前・殺虫剤																								
	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤											○										定植前日～定植時
定植時・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5											○	○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤										○	○										ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤										○	○	○									ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤											○										ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○	○		○	○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤										○	○			○							
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤											○										

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	葉かび病	すすかび病	灰色かび病	輪紋病	かいよう病	炭疽病	疫病	褐紋病	斑点病	うどんこ病	菌核病	軟腐病	茎えそ細菌病	褐色輪紋病							備考
定植後・殺菌剤																								
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤										○											
		グリセリン酢酸脂肪酸エステル	ベミデタッチ										○											
BM02		タラロマイセス　フラバス	タフパール	○		○																		
BM02		バチルス ズブチリス	アグロケア水和剤	○		○							○											
		バチルス ズブチリス	エコショット	○																				
M01 BM02		銅・バチルス ズブチリス	クリーンカップ	○	○					○														
NC		シュードモナス ロデシア	マスタピース水和剤					○							○	○								
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○		○								○										
		ベノミル	ベンレート水和剤	○		○								○										
10 1		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤	○		○								○										
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤	○	○	○							○	○										
2		プロシミドン	スミレックス水和剤			○																		
3		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤	○	○																			
		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○								○											
		ミクロブタニル	ラリー乳剤	○	○																			
		トリホリン	セーフガード乳剤	○	○																			
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○						○														
M03 4	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ							○														
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○	○	○							○	○										
		イソピラザム	ネクスターフロアブル	○	○	○	○						○	○										
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○	○	○							○	○										
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル	○		○							○	○										
		インピルフルキサム	カナメフロアブル（劇）	○	○	○							○	○										
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○				○			○											
9		メパニピリム	フルピカフロアブル			○																		

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	葉かび病	すすかび病	灰色かび病	輪紋病	かいよう病	炭疽病	疫病	褐紋病	斑点病	うどんこ病	菌核病	軟腐病	茎えそ細菌病	褐色輪紋病								備考
定植後・殺菌剤																								
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○		○																		
		マンデストロビン	スクレアフロアブル									○		○										
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	○						○		○										
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○	○	○							○	○										
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○	○	○			○	○		○												
M07 11		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリベンカルブ	ファンベル顆粒水和剤	○	○	○							○	○										
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル	○						○														
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20			○						○												
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤	○		○																		
			ポリオキシンAL水和剤	○		○																		
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル							○														
21 27		アミスルブロム・シモキサニル	ダイナモ顆粒水和剤							○														
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤							○														
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル							○														
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○						○														
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル							○														
49 21		オキサチアピプロリン アミスルブロム	ゾーベックエンテクタSE							○														
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC							○														
49 M03	UN	オキサチアピプロリン・マンゼブ	ゾーベック エニベル							○														
50		ピリオフェノン	クロスアウトフロアブル										○											
52		イプフルフェノキン	ミギワ10フロアブル			○								○										

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	葉かび病	すすかび病	灰色かび病	輪紋病	かいよう病	炭疽病	疫病	褐紋病	斑点病	うどんこ病	菌核病	軟腐病	茎えそ細菌病	褐色輪紋病	苗立枯病	さび病					備考
定植後・殺菌剤																								
M01		銅	コサイド3000							○														
			Zボルドー		○		○			○														
			クプロシールド	○	○			○		○														
		DBEDC	サンヨール	○		○							○											高温時には薬害が出る恐れがある
M04 M01		キャプタン・有機銅	オキシラン水和剤	○			○			○														
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○		○				○														
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	○			○			○														
			ジマンダイセンフロアブル	○						○														
M05		TPN	ダコニール1000	○	○	○	○		○	○		○	○				○	※						※活着後（但し、定食14日後まで）
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○		○																		
		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクートフロアブル	○	○	○							○											
M10	UN	キノキサリン系	パルミノ										○											
U06 3		シフルフェナミド・トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤										○											
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル			○							○											
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル							○														
NC		炭酸水素カリウム	カリグリーン	○		○							○						○					
NC M01		炭酸水素ナトリウム・銅	ジーファイン水和剤	○	○					○														

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	コガネムシ類幼虫	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考
	UNF	ボーベリア　バシアーナ	ボタニガードES				○																
			ボタニガード水和剤				○																ダクト内投入
	気	脂肪酸グリセリド	サンクリスタル乳剤	○			○									○		○					
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤	○			○									○							
NC		調合油	サフオイル乳剤	○			○									○		○	○				
M01		DBEDC	サンヨール	○			○									○							高温時には薬害が出る恐れがある。
	1B	MEP	スミチオン乳剤	○																※			※オオニジュウヤホシテントウで適用。ミツバチに対して影響あり
		ホスチアゼート	ガードホープ液剤(劇)															○			○		処理後根系への薬剤の移動を促すため、できるだけ早い時期に5～20リットル/平方メートルの水を灌注する。
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5												○								収穫開始10日前まで。ミツバチに対して影響あり
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤		○									○									
		シペルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○				○															
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○				○															ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤				○																ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA									○											生育初期。ミツバチに対して影響あり

定植後・殺虫剤

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	コガネムシ類幼虫	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類		備考
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○			○																	ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○			○																	
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤				○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤				○															○		ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○			○			○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○			○						○											クロバネキノコバエ類にも適用あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○			○																	ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤	○																				
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○			○						○											
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○			○												○					ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○					○			○											
		スピネトラム	ディアナSC		○	○	○			○			○											ミツバチに対して影響あり
	気5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE		○		○			○			○			○	○							トマトキバガ
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○		○			○								○						
		ミルベメクチン	コロマイト乳剤				○			○								○						
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○	○			○				○				○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アバメクチン	アグリメック(劇)				○				○		○					○						
	6 15	エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤	ｱﾌｧｰﾑｴｸｾﾗ顆粒水和剤		○					○														
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○			○																		
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○			○																		
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○									○			※	○	○					ミツバチに対して影響あり ※ナミハダニで登録 トマトキバガ
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○	○			○															
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○	○	○			※	○			○					○					※マメハモグリバエで適用
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤			○	○																	
		ルフェヌロン	マッチ乳剤		○	○	○			○			○						○					

定植後・殺虫剤

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	コガネムシ類幼虫	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考
	16	ブプロフェジン	アプロード水和剤					※1	※2														※1オンシツコナジラミ幼虫で適用 ※2タバココナジラミ幼虫で適用
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○																		
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル													○		○					
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○	○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○	○											○						ミツバチに対して影響あり
		スピロテトラマト	モベントフロアブル	○			○						○					○					マルハナバチに対する影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○																	
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○					○							○						
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○		○			○			○										ミツバチに対して影響あり。アゾキシストロビンとは混用しない（薬害）
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○			○			○				○						ミツバチに対して影響あり
	29	フロニカミド	ウララDF	○			○							○									
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤		○	○	○			○			○						○				
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○				○							○						シロイチモジヨトウにも適用あり
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤				○												○				
	34	フロメトキン	アベンジャーフロアブル						○				○						○				
			ファインセーブフロアブル（劇）						○				○						○				

定植後・殺虫剤