

30 年度

エコやまぐち農産物 栽培実績

1/3

| | | | |
|----|------------|------|-------|
| 品目 | 水稲 (ヒノヒカリ) | 認証区分 | エコ 50 |
|----|------------|------|-------|

水稲においては品種も記載すること

| は場番号 所在地 | 栽培面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|------------------------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | | | | | | | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 | |
| 市・町 | 約339箱 (11.9箱/10a) | 播 種 育 苗 | ~6/12 | (有苗等) 育苗培土 | | | | | (苗・種子)※ | | | | | |
| | 13.2 | 耕起、土作り 元肥 | 12月 | (ほ場) 醗酵鶏糞 味一番 | 3.7-0-4.4-3.1 4-0-5-3.6 | 150 140 | 5.6 5.6 | 0.0 0.0 | 12月 | ダコレート水和剤 ビームゾル タチガレエース | ベノミル TPN トリシクラゾール ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1 1 1 | 5月 |
| | 17.9 | 代かき、除草 | 3月~6月 5/30~6/5 7月~8月 | 土を練らないように乾いた時期に浅く耕起 除草は代かきと同時施用(点滴) | | | | | 2~3回 5/30~ 8/5 | (ほ場) デルカット乳剤 スクミノン | オキサジアゾン フタクロール メタアルデヒド | 除草 殺虫 | 1 1 1 | 代かきと同時 6/1~5 6/29~7/2 |
| | | 定 植 | 6/13~6/17 | 株間 26cm 42株/坪 | | | | | 6/13~6/17 | | | | | |
| | | 取 穫 | 10/8~10/20 | | | | | | | | | | | |
| | 35 20 合計 85.1 | | | | | | 合計 11.2 | 合計 0.0 | | | | | | 合計 5 |
| 計 | 85.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 421 kg/10a | 出荷量計画 | 372 kg/10a | 計 | | | 14.4 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | | | | 8 回 | 削減率 |
| | | | | 計 | | | 9.0 kg/10a | | 100.0% | | | | 21 回 | 61.9% |

使用する資材はすべて記載すること。

※注 - 種子への使用回数等についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用履歴について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

30 年度

エコやまぐち農産物 栽培実績

2/3

| | |
|----|------------|
| 品目 | 水稲 (ヒノヒカリ) |
|----|------------|

水稲においては品種も記載すること

| | |
|------|---------|
| 認証区分 | エ = 5 0 |
|------|---------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| 市・町 | 約339箱 (11.9箱/10a) | 播種 育苗 | ~6/12 | (育苗等) 育苗培土 | | | | | | | (苗・種丁) ※ | | | | | |
| | 33.8 | 耕起, 土作り 元肥 | 12月 | (ほ場) 醗酵鶏糞 味一番 | 3.7-0-4.4-0.1 4-0-5-3.6 | 150 140 | 5.6 5.6 | 0.0 0.0 | 12月 | ダコレート水和剤 ピームゾル タチガレエース | ベノミル TPN トリシクラゾール ヒドロキシイメキサゾール | 殺菌 | 1 1 1 | 5月 | | |
| | 17.7 | 代かき, 除草 | 3月~5月 5/30~6/5 | 土を乾かないように乾いた時期に浅く耕起 除草は代かきと同時施用 (点滴) | | | | | 2~3回 5/30~ 6/5 | (ほ場) デルカット乳剤 | イキサジアゾン ブタクロール | 除草 | 1 1 | 代かきと同時 5/1~6 | | |
| | 19.5 | 定植 | 7月~8月 | 株間 26cm 42株/坪 | | | | | 6/13~6/17 | | | | | | | |
| | 50 | 収穫 | 6/13~6/17 10/6~10/20 | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 178.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 178.6 | | | | | | 合計 11.2 | 合計 0.0 | | | | | 合計 7 | | | |
| 収穫量計画 | 421 kg/10a | 出荷量計画 | 372 kg/10a | 計 | | | 14.4 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | | | | 7 回 | 削減率 | | |
| | | | | 山口県基準 | | | 9.0 kg/10a | | 100.0% | 山口県基準 | | | 21 回 | 66.6% | | |

※苗・種子への使用量架数についても記載すること

エコ100の申請において不使用する種子・苗の入手が明確な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | |
|------------------|------------|
| 品目 | 水稲 (ヒノヒカリ) |
| 水稲においては品種も記載すること | |

| | |
|------|--------|
| 認証区分 | エコ 5 0 |
|------|--------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|----------------------|------------------------------|--|---------------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 kg/10a | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | | | |
| 市・町 | 約339箱 (11.9箱/10a) | 播種 育苗 | ~6/12 | (育苗等) 育苗培土 | | | | | | | (苗・種子)※ | | | | | | | |
| | | 耕起,土作り 元肥 | 12月 | (ほ場) 厩肥鶏糞 株一番 | 3.7-0-4.4-3.1 4-0-5-3.6 | 150 140 | 5.6 5.6 | 0.0 0.0 | 12月 | ダコレト水和剤 ピームゾル タチガレエース | ベノミル TPN ホトロキンイノキサゾル メダラマシル | 殺菌 | 1 1 1 1 | 5月 | | | | |
| | | 代かき,除草 | 3月~5月 5/30~6/5 7月~8月 | 土を踏らないように乾いた時期に浅く耕起 除草は代かきと同時施用(点噴) | | | | | 2~3回 5/30~ 6/5 | (ほ場) デルカント乳剤 オーワンフロアブル | オキサジアゾン フクグロール オキサジクロメホン テフリルトリアン | 除草 | 1 1 1 | 代かきと同時 5/30~6/5 6/28 | | | | |
| | 19 | 定植 | 6/13~6/17 | 株間 26cm | 42株/坪 | | | | 6/13~6/17 | | | | 1 | | | | | |
| | | 収穫 | 10/6~10/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 19.0 | | | | | | 合計 11.2 | 合計 0.0 | | | | | 合計 9 | | | | | |
| 計 | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | | | 14.4 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | | 計 | | | 9回 | 削減率 | | | | |
| 421 kg/10a | 372 kg/10a | 山口県基準 | | | | 9.0 kg/10a | 100.0% | | 山口県基準 | | | 21回 | 57.1% | | | | | |

※苗・種子への降雨回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬についで記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。