

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成 29 年 10 月 25 日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号    | 農薬名（商品名） | 種類名        | 製造者名       |
|---------|----------|------------|------------|
| 第20817号 | 三菱ハチハチ乳剤 | トルフェンピラド乳剤 | 日本農薬(株)    |
| 第20818号 | ハチハチ乳剤   | トルフェンピラド乳剤 | OATアグリオ(株) |

### ■変更内容及び変更理由

#### 【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ） 】

- ・ 作物名「トマト」、「ミニトマト」、「非結球レタス」、「なす」を削除する。
- ・ 作物名「レタス」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更し、適用病害虫名「白さび病」、「ワッカ症」を削除し、「アオムシ」、「コガ」、「アブラムシ類」、「キジノミハムシ」、「ハイダラノメイガ」、「ナモグリバエ」、「カブラハチ」の希釈倍数を「1000～2000倍」から「2000倍」に変更する。
- ・ 作物名「かぶ」の本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更し、適用病害虫名「カブラハチ」、「白さび病」を削除し、「キジノミハムシ」、「コガ」の希釈倍数を「1000～2000倍」から「2000倍」に変更する。
- ・ 作物名「ねぎ」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「ピーマン」の本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名    | 適用病虫害名   | 希釈倍数       | 使用<br>液量             | 使用時期     | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法 | トルフェンピラト<br>を含む<br>農薬の総使<br>用回数 |
|--------|--|------------|----------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|
| レタス    | アブラムシ類、ナメグサバエ  | 1000～2000倍 | 100～<br>300L<br>／10a | 収穫3日前まで  | 2回<br>以内            | 散布       | 2回以内                            |
|        | ナメグサ類、べと病  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| 非結球レタス | アブラムシ類、ナメグサバエ  | 1000～2000倍 |                      | 収穫14日前まで |                     |          |                                 |
|        | ナメグサ類、べと病  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| だいこん   | アオムシ、コカガ、アブラムシ類<br>キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ<br>ナメグサバエ、カブラハハチ | 1000～2000倍 |                      | 収穫7日前まで  |                     |          |                                 |
|        | 白さび病、ワッカ症  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| かぶ     | キスジノミハムシ、コカガ   | 1000～2000倍 |                      | 収穫前日まで   |                     |          |                                 |
|        | ハイマダラノメイガ、ナメグサバエ<br>アブラムシ類                             | 2000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
|        | カブラハハチ、白さび病  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| なす     | アブラムシ類、アザミマ類<br>コジラミ類、マハメグサバエ                          | 1000～2000倍 |                      | 収穫前日まで   |                     |          |                                 |
|        | チャノホリダニ  | 1000～4000倍 |                      |          |                     |          |                                 |
|        | フビクロハネキノコバエ  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
|        | うどんこ病  |            |                      |          |                     |          |                                 |
| トマト    | アブラムシ類、コジラミ類<br>アザミマ類、トマトサビダニ                          | 1000～2000倍 | 収穫前日まで               |          |                     |          |                                 |
|        | ナメグサバエ類、うどんこ病  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| ミニトマト  | アブラムシ類、コジラミ類<br>アザミマ類、トマトサビダニ                          | 2000倍      | 収穫3日前まで              |          |                     |          |                                 |
| ねぎ     | アザミマ類、アブラムシ類、ネギコガ<br>シロイモシヨウ、さび病、べと病                   | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| ブロッコリー | アオムシ、アブラムシ類、コカガ  | 1000～2000倍 | 収穫前日まで               |          |                     |          |                                 |
| ピーマン   | アザミマ類  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
|        | チャノホリダニ、コジラミ類<br>うどんこ病                                 |            |                      |          |                     |          |                                 |

〔変更後〕

| 作物名    | 適用病虫害名   | 希釈倍数       | 使用<br>液量             | 使用時期     | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法 | トルフェンピラト<br>を含む<br>農薬の総使<br>用回数 |
|--------|--|------------|----------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|
| レタス    | アブラムシ類、ナメグサバエ  | 1000～2000倍 | 100～<br>300L<br>／10a | 収穫14日前まで | 2回<br>以内            | 散布       | 2回<br>以内                        |
|        | ナメグサ類、べと病  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
| だいこん   | アオムシ、コカガ、アブラムシ類<br>キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ<br>ナメグサバエ、カブラハハチ | 2000倍      |                      | 収穫30日前まで |                     |          |                                 |
|        | キスジノミハムシ、コカガ<br>ハイマダラノメイガ、ナメグサバエ<br>アブラムシ類             |            |                      |          | 1回                  |          |                                 |
| かぶ     | キスジノミハムシ、コカガ<br>ハイマダラノメイガ、ナメグサバエ<br>アブラムシ類             | 1000倍      |                      | 収穫7日前まで  |                     |          |                                 |
| ねぎ     | アザミマ類、アブラムシ類<br>ネギコガ、シロイモシヨウ<br>さび病、べと病                |            |                      |          | 2回<br>以内            |          |                                 |
| ブロッコリー | アオムシ、アブラムシ類、コカガ  | 1000～2000倍 |                      | 収穫前日まで   |                     |          |                                 |
| ピーマン   | アザミマ類  | 1000倍      |                      |          |                     |          |                                 |
|        | チャノホリダニ、コジラミ類<br>うどんこ病                                 |            |                      |          |                     |          |                                 |

**【 申請者による変更理由 】**

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。